

### **AGREST BIAŁY – RIBES UVA-CRIPSA „PAX”**



Krzew o dość silnym wzroście, ma zwarty kulisty pokrój. Wcześnie wchodzi w okres owocowania. Odmiana deserowa nadająca się na przetwory, bardzo plenna. Owoce o kwaskowatym miąższu, bardzo aromatyczne, smaczne. Owocuje obficie i regularnie, dojrzałość zbiorczą osiąga w połowie Lipca. Odmiana odporna na mączniaka agrestu.

### **AGREST CZERWONY**



Odmiana fińska. Wzrost roślin dość słaby, pokrój kulisty spłaszczony, zwarty. Skórka owoców czerwona, lekko owłosiona, z pojedynczymi szczecinkami i bardzo wyraźnymi żyłkami. Wymaga żyznych gleb. Owoce dojrzewają pod koniec pierwszej dekady lipca. Wybitnie deserowe, nadają się również na przetwory. Owocowanie obfite. Odporna na mróz. Dość odporna na amerykański mączniak agrestu.

## **Aronia czarna**



Krzew o rozłożystym pokroju, przeważnie dorastający do 2m wys., mało wrażliwy na choroby. Wcześnie wchodzi w okres owocowania dając już w 3 roku wzrostu obfite plony. Owoce prawie czarne, kuliste o średnicy około 1cm, z szarawym nalotem, mało smaczne ale doskonale do poprawy np.: soków i dżemów. Zbiór na początku października.

## **Borówka Amerykańska**



### **Aurora**

Najpóźniej dojrzewająca odmiana. Jagody tej odmiany dojrzewają 7-10 dni po odmianie Elliott. Plonuje obficie i równomiernie

### **Bluecrop**

Odmiana uważana jest za najwartościowszą, najczęściej sadzoną na świecie. Bardzo plenna. Owocuje przez około 30 dni, od połowy lipca. Owoce wydawane przez tą odmianę są duże, kuliste, lekko spłaszczone. Barwa

owoców zwykle jest jasnoniebieska. Odmiana uważana za bardzo smaczną. Skórka owocu jest mocna, wyjątkowo pęka w czasie długotrwałych deszczów. Owoce zgrupowane są w duże grona o wyrównanej wielkości i luźnej strukturze. Również pokrój krzewu jest luźny, a przy silnym owocowaniu pędy mogą kłaść się na ziemię. Wtedy także wymagają podwiązki. Zebrane owoce odmiany bluecrop doskonale nadają się do transportu i dobrze go znoszą nawet przy długim czasie przewozu.

### **Brigitta (Brygitta) Blue**

Odmiana wyhodowana i wyselekcjonowana w Australii, wprowadzona do uprawy w roku 1980. Rozpoczyna dojrzewanie w 2 tygodnie po odmianie Bluecrop. Plenna. Jej owoce są średniej wielkości lub duże,

### **Chandler**

Odmiana amerykańska, wprowadzona w 1994 roku. Wyróżnia się długim okresem dojrzewania i zbioru jagód ? od 4 do 6 tygodni. Plenna, wydaje owoce bardzo duże, jasnoniebieskie. Krzew rośnie silnie, pędy ma wzniesione i dobrze rozgałęzione

### **Darrow**

Odmiana ta owocuje od połowy sierpnia przez około 3 tygodnie. Jest średnio plenna, co jednak rekompensują jej owoce - bardzo duże, lekko spłaszczone, jędrne, słodko-winne, bardzo smaczne. Odmiana o charakterze ewidentnie deserowym. Wzrost krzewu jest dość słaby, krzew ma luźny pokrój. Wymaga dobrych warunków siedliskowych.

### **Draper**

Odmiana amerykańska, wprowadzona do uprawy w 2004 roku, o średniej porze dojrzewania ? kilka dni przed odmianą Bluecrop. Bardzo plenna, wydaje jagody duże, jasnoniebieskie, wyjątkowo jędrne, bardzo aromatyczne, o mocnej skórce, zebrane w luźnych gronach. Owoce dobrze znoszą zbiór mechaniczny, długo się przechowują

### **Duke**

Odmiana wczesna, zaczyna owocować około 10 dni przed odmianą Bluecrop. Bardzo plenna. Owoce są zróżnicowanej wielkości, pierwsze bardzo duże, późniejsze średnie. Kształt owoców okrągły, barwa jasnoniebieska. Dzięki wysokiej twardości bardzo dobrze znoszą przechowywanie i transport.

### **Earliblue**

Odmiana bardzo wczesna, dość plenna. Owoce o kształcie lekko spłaszczonym, jasnoniebieskie, dość jędrne, smaczne i aromatyczne, o zróżnicowanej wielkości - pierwsze bardzo duże, potem mniejsze, a na końcu małe. Owoce niestety bardzo lubiane przez ptaki. Krzew rośnie silnie, pędy wzniesione, dość gęste. Odmiana sprawdzająca się w regionach bardziej narażonych na przymrozki dzięki wysokiej wytrzymałości na mróz

### **Jersey**

Jedna z najstarszych (i najbardziej znanych) amerykańskich odmian borówki. Dojrzewa późno. W smaku średniej wielkości, kuliste owoce przypominają leśne jagody. Aromat słodko-winny. Owoce zebrane są w grona. Bardzo dobrze sprawdzają się w przetworach, nie nadają się natomiast do długotrwałego transportu. Krzew rośnie bardzo silnie. Ta odmiana wymaga intensywnego cięcia.

### **Liberty**

Późno dojrzewająca odmiana, wprowadzona do uprawy w 2003 roku. Jagody są średniej wielkości lub duże, jasnoniebieskie, bardzo jędrne, smaczne, lekko kwaskowate. Dojrzewa tuż przed odmianą Elliott. Krzew rośnie silnie, pędy ma wzniesione, nieco rozkładające się, i zwisające pędy owoconośne. Pędy i pąki kwiatowe dobrze znoszą wahania temperatury a nawet mrozy do ?25 stopni Celsjusza.

### **Puru**

Średnio wczesna Odmiana pochodząca z Nowej Zelandii. Wydaje owoce duże, wyrównanej wielkości, dość smaczne i jędrne, dzięki czemu dobrze znoszą one transport. Krzew średnio silnie rosnący. Ma grube pędy i bardzo dużych liściach.

### **Reka**

Wczesna, bardzo plenna odmiana. Niestety ma tendencje do drobnienia owoców. Owoce lekko spłaszczone, smak słodko-winny. Krzew o pokroju luźnym, kulistym rośnie dość silnie i wymaga dość znacznego cięcia.

### **Toro**

Odmiana amerykańska, wprowadzona do uprawy w 1987 roku. Owoce bardzo duże, jędrne, zebrane w długich gronach przypominających nieco winogrona. Barwa matowoniebieskie. Zaleca się pierwszy zbiór ręczny, a dopiero następne ? mechaniczne. Uważana za najlepszą ze wszystkich odmian borówki o podobnej do odmiany Bluecrop porze dojrzewania. Krzew rośnie silnie, pędy ma sztywne, wzniesione. Jest stosunkowo odporny na mróz.

### **Dereń jadalny Cornus mas „Jolico”**



Drzewo lub krzew o wys. Do 3m. Kwitnie na żółto w marcu. Bardzo wczesnie rozpoczyna owocowanie. Liczne ciemnoczerwone, wyjątkowo duże, kwaśne owoce nadają się do zbioru pod koniec września. Wykorzystywane są leczniczo, głównie w schorzeniach żołądka. Odmiana obco płodna o niewygórowanych wymaganiach glebowych, mało wrażliwa na choroby.

### **Jeżyna bezkolcowa „Black Satin” Rubus fruticosus**



Krzew charakteryzujący się bardzo silnym wzrostem. Tworzy sztywne, bezkońcowe pędy. Nie dają odrostów korzeniowych. Plonują bardzo obficie. Owoce duże, wydłużone, czarne, błyszczące, kwaskowate i miękkie. Pierwsze zbiera się w połowie VIII, ostatnie- pod koniec X. Odmiana średnio wrażliwa na szarą pleśń.

#### **Jeżyna bezkolcowa *Rubus fruticosus* „Orkan”**

Silnie rosnący krzew tworzący bezkońcowe silne pędy. Nie dają odrostów korzeniowych. Owocuje bardzo obficie w ciepłych i cichych, żyznych i wilgotnych stanowiskach ,zawijając owoce wyłącznie na dwuletnich pędach. Owoce duże lub bardzo duże o cylindrycznym kształcie.

#### **Leszczyna pospolita *Corylus avellana* „Cosford”**



Drzewo lub krzew średnio silnie rosnące. Zaczyna wcześniej i obficie owocować. Orzechy duże wydłużone z cienką, czerwonobrunatną skorupą, o średnio dużym, walcowatym, bardzo smacznym jądrze. Łatwo wypadają z okryw. Do zbioru nadają się w drugiej połowie września. Odmiana mało podatna na choroby. Jest bardzo dobrym zapylaczem.

#### **Leszczyna pospolita *Corylus avellana* „Halle”**



Silnie rosnące drzewo lub krzew dość wcześniej owocujące dając obfite plony. Orzechy duże, stożkowate z grubą, żółtawobrunatną skorupą, o dużym jajowatym, smacznym jądrze, pojedyncze lub po 2-3 owocowanie. Łatwo wypadają z pokryw. Dojrzewają pod koniec września. Odmiana średnio wrażliwa na choroby.

### **Leszczyna pospolita *Corylus avellana* „Syrena”**



Drzewo lub krzew dość silnie rosnący. Bardzo wczesnie rozpoczyna owocowanie plonując obficie. Orzechy średniej wielkości, nieco wydłużone z cienką brunatną skorupą o dość dużym, jajowatym smacznym jądrze. Łatwo wypadają z ciemnoczerwonych okryw. Nadają się do zbioru już w drugiej poł. IX. Odmiana mało podatna na choroby, dekoracyjna ze względu na czerwone zabarwienie okryw, kotek i młodych liści.

### **Orzech włoski *Juglans regia* „Mars”**

Silnie rosnące drzewo wczesnie rozpoczynające owocowanie dając obfite plony. Orzechy średniej wielkości, owalne, z cienką ale dość mocną i gładką skorupą o stosunkowo dużym, jasnobrązowym, słodkim, smacznym jądrze, dobrze wypełniającym skorupę i zwykle wyluskującym się w całości. Do zbioru na przełomie września i października. Odmiana mało wrażliwa na antraknozę.